



*Allium ursinum* L., 1753

Ail des ours

Famille des Amaryllidaceae

Photo: S. FILOCHE

Liste rouge

NE

Arrêté ZH



Statut

Indigène

Protection

sans objet

Humidité édaphique



Période optimale  
d'observation

J F M A M J J A S O N D

## Description

Plante vivace de 25-35 cm, glabre, à forte odeur d'ail, munie d'un bulbe petit, en fuseau très étroit, entouré de tuniques blanches membraneuses. Tige dressée, molle, courte, semi-cylindrique à 2 angles saillants. Deux feuilles basales en général, ovales-lancéolées, larges de 2-6 cm, longuement pétiolées, planes, molles. Inflorescence en ombelle simple, lâche, sans bulbilles, ouverte en étoile ; deux spathes en général, caduques, ne dépassant pas l'ombelle. Fleurs d'un blanc pur, longuement pédicellées à pédicelles égaux ; périanthe étalé, à tépales lancéolées-aiguës, caduques, plus long que les étamines ; étamines à filets tous simples ; stigmate obtus. Fruit : capsule.

## Confusions possibles

L'ail des ours est assez caractéristique et se distingue assez facilement des autres espèces du même genre, par ses feuilles longuement pétiolées, à limbe ovale-lancéolé, ses fleurs blanches et ses bulbes en forme de fuseau.

## Caractères biologiques

Géophyte à tubercules.

## Caractères écologiques


Espèce hygrosciaphile, neutro-nitrophile, des sols profonds à bonne réserve en eau, riches en bases et en azote, en contexte de vallons ou de fortes pentes : sous-bois de forêts fraîches ou humides, bords de ruisseaux.

## Végétations concernées

Espèce essentiellement présente dans les chênaies-frênaies fraîches du *Fraxino excelsioris* - *Quercion roboris*, dans les aulnaies-frênaies de l'*Alnenion glutinoso-incanae* et dans les tillaies-acéraies sur éboulis ou en situation de ravins du *Tilio platyphylli* - *Acerion pseudoplatani*.

## Répartition géographique

Espèce subatlantique en Europe. *Allium ursinum* est une espèce assez commune en France excepté dans le Sud-Ouest et en région méditerranéenne. Dans le bassin Seine-Normandie, elle est répartie sur l'ensemble des départements, y compris urbains, avec néanmoins des fréquences inégales. Elle est ainsi particulièrement bien représentée au nord et à l'ouest de Paris (Île-de-France), dans le Bas Morvan (Bourgogne), sur le plateau Barrois (Haute-Marne), l'ensemble du Calvados, dans les vallées de la Seine, de la Risle, le Petit Caux (Haute-Normandie) et à l'est de la Picardie. Elle est beaucoup plus rare et localisée ailleurs.



## Sociabilité - Etat des populations - Menaces

L'ail des ours est une espèce sociale qui peut former des populations étendues. Elle est assez commune localement dans le bassin Seine-Normandie. Cette espèce occupe souvent des boisements à faible valeur économique et ne semble pas menacée à court terme. Elle est cependant parfois soumise à des transformations de forêts humides (extension de peupleraies par exemple).