Anacamptis laxiflora (Lam.) R.M.Bateman,

Orchis à fleurs lâches

Famille des Orchidaceae

Photo: S. FILOCHE

Liste rouge: VU

Arrêté ZH: ✓

Statut

Indigène

Protection

Bourgogne, Champagne-Ardenne, Centre-Val de Loire

Humidité édaphique

Période optimale d'observation

J F M **A** **M** **J** J A S O N D

Description

Plante vivace élancée, haute de 30-70 cm, à tubercules ovoïdes entiers. Tige pourpre au sommet, feuillée presque jusqu'en haut. Feuilles réparties le long de la tige, au nombre de 3 à 8, embrassantes, dressées, linéaires-lancéolées, pliées en gouttière, aiguës, non maculées ; les basilaires plutôt rapprochées, les supérieures bractéiformes et subengainantes. Inflorescence en épi lâche et allongé (jusqu'à 25 cm), cylindrique, à 20-40 fleurs ; bractée florale aussi longue que l'ovaire, foliacée, plurinervée, rouge violacé au sommet. Fleurs zygomorphes, grandes, largement écartées de la tige, pourpre violacé foncé ; sépales latéraux dressés, verticaux, sépale dorsal connivent avec les pétales latéraux, ceux-ci un peu moins longs que le sépale dorsal ; labelle faiblement trilobé, bien plus large que long ; lobes latéraux fortement réfléchis, larges, arrondis, parfois un peu crénelés ; lobe médian plus court que les latéraux, avec la partie centrale coudée ; éperon égalant environ les deux tiers de l'ovaire, ascendant, légèrement arqué, à sommet dilaté et souvent échancré. Fruit : une capsule.

Confusions possibles

Risque de confusion avec l'orchis des marais (*Anacamptis palustris*), ce dernier en diffère par son port plus élancé, sa tige plus grêle, ses feuilles moins nombreuses et plus étroites, ses fleurs ordinairement plus claires, et surtout par son labelle à lobe médian bien distinct.

Caractères biologiques

Géophyte à tubercules.

Caractères écologiques

Espèce héliophile, des substrats humides à détrempés, alcalins à légèrement acides et relativement pauvres : presque exclusivement dans des prairies. Souvent en contexte alluvial.

Végétations concernées

Espèce présente essentiellement dans les groupements de prairies de fauche hygrophiles du *Bromion racemosi*, parfois dans des prairies mésohygrophiles fauchées du *Colchico autumnalis - Arrhenatherenion elatioris* ; mais aussi en Normandie, dans les marais arrière littoraux.

Répartition géographique

Espèce méditerranéenne-atlantique, présente dans une grande partie de l'Europe. En France, elle est dispersée sur une large partie du territoire mais avec des fréquences variables ; parfois localement bien présente dans le Sud et le Sud-Ouest ; très rare ou nulle dans le Nord et le Nord-Est. Sur le bassin Seine-Normandie, elle est fréquente dans le domaine atlantique, aussi bien en Basse-Normandie qu'en Haute-Normandie, où elle se raréfie. L'espèce est encore assez fréquente dans les prairies de l'estuaire de la Seine et de la basse vallée de la Risle (Eure). Disparue des autres régions, elle ne se maintient que dans de rares stations dans l'Yonne, en Champagne-Ardenne et dans le Loiret.



Sociabilité - Etat des populations - Menaces

Cette espèce, qui peut former des populations très importantes, est en forte régression, en particulier sur les marges de son aire. Les menaces sont d'une part la destruction de ses milieux par drainage ou par assèchement, et d'autre part la déprise agricole et la disparition des pratiques traditionnelles d'élevage qui provoquent l'abandon des prairies. Des modes de gestion appropriés (pacage extensif) l'ont fait réapparaître dans le Marais Vernier, en Normandie.