

Alopecurus aequalis Sobol., 1799

Vulpin roux, Vulpin fauve

Famille des Poaceae

Photo: S. FILOCHE

Liste rouge	Arrêté ZH
NE	✓

Statut

Indigène

Protection

sans objet

Humidité édaphique

Période optimale d'observation

J F M A **M** **J** **J** A S O N D

Description

Plante vivace ou annuelle de 20-80 cm de haut, glabre, à racine fibreuse. Tige genouillée-ascendante, souvent flottante et radicante. Feuilles d'un vert glauque, larges de 3-5 mm à ligule allongée et membraneuse. Inflorescence en panicule spiciforme, cylindrique, larges de 3-4 mm, un peu plus atténuée au sommet, à rameaux très courts, portant 1-4 épillets longs de 2 mm ; glumes égales, pliées en deux, soudées à la base, subobtuses, ciliées ; lemme lancéolée, denticulée au sommet, portant vers le milieu une arête courte ne dépassant pas ou très peu les glumes, anthères fauves-orangées. Fruit : caryopse.

Confusions possibles

Le vulpin roux est très proche du vulpin genouillé (*Alopecurus geniculatus*), dont il se distingue par des arêtes insérées sous le milieu de la lemme et ne dépassant pas ou de peu les glumes. Ces deux espèces peuvent également s'hybrider entre elles.

Caractères biologiques

Hémicryptophyte à stolons, plus rarement thérophyte.

Caractères écologiques

Espèce hygrophile, en conditions oligotrophes à mésotrophes sur sols vaseux ou sableux et plus ou moins exondées : mares forestières exondées, dépressions humides des prairies, fossés asséchés.

Végétations concernées

Espèce présente dans les groupements à physionomie de prairies amphibies à flottantes, en bordure de mares ou de prairies, en particulier dans le *Glycerio fluitantis-Sparganion neglecti* ou le *Bidention tripartitae*.

Répartition géographique

Le vulpin roux est une espèce circumboréale, largement répartie en France, mais à distribution inégale. Dans le bassin Seine-Normandie, elle est peu fréquente, localisée principalement dans le Morvan (Bourgogne), en Champagne humide (Aube, Haute-Marne, Marne), en Argonne (Ardennes, Marne, Meuse), dans le massif de Fontainebleau et de Rambouillet et dans la Brie Française (Île-de-France). En Normandie, elle est disséminée en pays d'Auge calvadosien et sur le plateau de Neubourg (Eure). Elle est très rare en Picardie, surtout en Thiérache axonnaise, et ponctuelle dans le Laonnois (Aisne).



Sociabilité - Etat des populations - Menaces

Sans pour autant être répandu, le vulpin roux peut être localement fréquent. Il est difficile d'évaluer les menaces qui pèsent sur cette espèce du fait des confusions avec le vulpin genouillé. Il reste néanmoins sensible à toute modification apportée à son milieu (eutrophisation de l'eau de la nappe, drainage, comblement de mares, fertilisations trop importantes...).