



Alopecurus bulbosus Gouan, 1762

Vulpin bulbeux

Famille des Poaceae

Photo: CBNBP

Liste rouge

Arrêté ZH

NE




Statut

Indigène

Protection

Basse-Normandie, Lorraine

Humidité édaphique



Période optimale
d'observation

J F M A M J J A S O N D

Description

Plante vivace à tige grêle, dressée ou couchée présentant un entre-nœud inférieur renflé-bulbeux. Feuilles engainantes, la supérieure à gaine longue et un peu renflée ; limbe étroit (1-3 mm), le supérieur court ; ligule oblongue. Inflorescence en panicule spiciforme dense ; épillet contenant une seule fleur ; glumes égales, velues, comprimées-carénées, un peu soudées à la base, aiguës au sommet ; fleurs verdâtres à lemme longue d'environ 3 mm, munie d'une arête dorsale ; pas de paléole. Fruit : caryopse, restant enfermé dans les glumelles.

Confusions possibles

Cette espèce ne doit pas être confondue avec les formes plus ou moins bulbeuses d'*Alopecurus pratensis* et surtout d'*Alopecurus geniculatus*.

Caractères biologiques

Hémicryptophyte.

Caractères écologiques


Plante prairiale neutrophile, hygrophile, se développant sur sols argileux et/ou limoneux, assez riches en matière organique, méso-eutrophiles, oligohalins : polders, prairies plus ou moins saumâtres, bords de mares. Elle remonte un peu les vallées des fleuves.

Végétations concernées

Espèce des végétation prairiales sur sols engorgés ou inondables, au sein de communautés littorales, légèrement halophiles du *Loto tenuis* - *Trifolion fragiferi*. On peut également l'observer dans la végétation des "prés salés" atlantiques, dans les niveaux supérieurs et hauts de schorre, correspondant à l'alliance de l'*Armerion maritimae*.

Répartition géographique

Espèce localisée aux côtes du sud et de l'ouest de l'Europe, de l'Allemagne à la Croatie, excepté le Portugal. En France, elle est surtout localisée dans l'Ouest et le midi. Dans le bassin Seine-Normandie, le vulpin bulbeux est présent essentiellement dans l'estuaire de la Seine, autrefois jusqu'à Villequier. Il est connu de longue date à Criel-sur-Mer (Seine-Maritime), dans les prairies de l'embouchure de l'Yères, où il est encore présent. On le trouve également dans les marais du Cotentin et sur les prés du littoral avranchin (Manche), en pays d'Auge ou encore proche de l'estuaire de l'Orne (Calvados).



Sociabilité - Etat des populations - Menaces

Espèce discrète, semblant globalement se maintenir, mais qui est localement menacée par une intensification des pratiques agricoles engendrant des modifications profondes des prairies : drainage, amendement, surpâturage, pollutions, etc.