



**Baldellia ranunculoides (L.) Parl., 1854**

Flûteau fausse-renoncule

Famille des Alismataceae

Photo: F. PERRIAT

Liste rouge

Arrêté ZH

NE



Statut

Indigène

Protection

Bourgogne, Champagne-Ardenne,  
Haute-Normandie, Île-de-France

Humidité édaphique



Période optimale  
d'observation

J F M A M J J A S O N D

## Description

Pante vivace herbacée de 7-8 à 20 cm de haut, à tige souterraine courte. Tiges généralement dressées, parfois rampantes et s'enracinant aux noeuds. Feuilles en rosette basale, celles dressées étant simples, entières, à limbe ovale-allongé, étroit, aigu au sommet, atténué à la base en un long pétiole engainant. Fleurs pédonculées, solitaires ou réunies en ombelle de 3-10 fleurs, assez grandes (jusqu'à 2 cm de diamètre) ; 3 petits tépales externes vert-rougeâtre, 3 grands tépales internes rose pâle ou blanchâtres, en général maculés de jaune d'or au centre ; étamines nombreuses ; carpelles nombreux, anguleux, acuminés, en tête subsphérique. Fruit : polyakène.

## Confusions possibles

Les confusions ne sont guère possibles, sauf peut-être à l'état végétatif avec d'autres Alismatacées comme l'étoile d'eau (*Damasonium alisma*) et le flûteau nageant (*Luronium natans*). Les deux sous-espèces habituellement distinguées sont depuis peu élevées à un rang spécifique. On distingue donc maintenant *Baldellia repens* subsp. *cavanillesii* et *Baldellia ranunculoides*.

## Caractères biologiques

Hémicryptophyte vivace.

## Caractères écologiques


Espèce héliophile, des milieux oligotrophes, argilo-sableux ou caillouteux, inondées en hiver mais émergées en été : grèves d'étangs, mares temporaires de platières, bas-marais alcalins et marais tourbeux. Espèce un peu ubiquiste, présente jusque dans les fossés ou les mares de carrières abandonnées, les ornières de chemins, etc.

## Végétations concernées

Espèce présente dans les gazons amphibies, ras et clairsemés des grèves d'étangs du *Littorellion uniflorae* ou de l'*Elodo palustris* - *Sparganion*, et parfois en contact dans les bas-marais alcalins de

## Répartition géographique

Le flûteau fausse-renoncule est une espèce méditerranéo-atlantique, présente dans une large moitié ouest du pays, sur le pourtour méditerranéen et dans les zones de basse altitude de la région Rhône-Alpes (espèce typiquement planitiaire). Elle est plus rare à l'intérieur des terres, où sa répartition est alors liée à de grandes zones d'étangs (Sologne, Brenne). Dans le bassin Seine-Normandie, elle est surtout présente en Normandie dans les zones de grands marais. En Haute-Normandie, elle se maintient en plusieurs localités de la vallée de la Seine en aval de Rouen. Elle se fait de plus en plus rare en allant vers l'est : quelques stations dispersées en Île-de-France (surtout dans la Bassée ou encore dans le massif de Fontainebleau), dans l'Aube, la Marne, en Bourgogne (étangs de Puisaye dans l'Yonne), dans l'Oise (Sacy-le-Grand et environs) et dans l'Aisne (marais du Laonnois).



## Sociabilité - Etat des populations - Menaces

C'est une plante assez erratique, pouvant former, certaines années, d'abondantes populations, mais qui est en régression constante. Les menaces qui pèsent sur cette espèce sont multiples : atterrissement et comblement des mares, drainage et régularisation du niveau des zones humides, baisse de la qualité des eaux par pollutions et eutrophisation des plans d'eau et des nappes superficielles, surfréquentation et piétinement des grèves, densification et fermeture du milieu.