



Barbarea vulgaris R.Br., 1812

Barbarée commune

Famille des Brassicaceae

Photo: G. HUNAUT

Liste rouge

NE

Arrêté ZH



Statut

Indigène

Protection

sans objet

Humidité édaphique



Période optimale
d'observation

J F M A M J J A S O N D

Description

Plante bisannuelle ou vivace, glabre de 20-90 cm de haut. Tige dressée, cannelée, ramifiée seulement dans le haut. Feuilles alternes, d'un vert foncé, luisantes ; les inférieures à limbe pennatiséqué à 2-5 paires de lobes latéraux, oblongs, le terminal plus grand, ovale ou arrondi ; les supérieures généralement indivises à limbe ovale, denté-sinué, auriculé, demi-embrassant. Inflorescence en racème simple, dense, s'allongeant à la fructification. Fleurs assez grandes ; pédicelles égalant les sépales, bien plus courts que les fruits ; corolle à 4 pétales jaune vif beaucoup plus longs que le calice. Fruit : silique quadrangulaire, dressée ou un peu étalée, terminée par un bec long de 3 mm environ.

Confusions possibles

La barbarée commune est proche de la barbarée intermédiaire (*Barbarea intermedia*), mais s'en distingue par des feuilles supérieures à limbe denté ou lobé jamais pennatifide ni pennatipartite, munies à la base d'une ou deux paires de petits lobes peu distincts.

Caractères biologiques

Hémicryptophyte.

Caractères écologiques

Plante neutro-nitrophile, mésohygrophile à hygrophile, à écologie assez large et qui se trouve dans un grand nombre de végétations humides herbacées eutrophiles : friches, prairies humides, mégaphorbiaies, layons forestiers, boisements rivulaires, peupleraies et parfois en contexte rudéral (villages, talus routiers, bords de chemins ou décombres).


Végétations concernées

L'espèce est présente dans les mégaphorbiaies eutrophiles des *Convolvuletalia sepium*, les ourlets forestiers nitrophiles du *Galio aparines* - *Urticetea dioicae*, les prairies humides mésotrophiles à eutrophiles des *Agrostietea stoloniferae*, les ourlets intraforestiers printaniers en situation ombragée des

Cardaminetea hirsutae ou dans des friches anthropogènes des stations rudéralisées et irrégulièrement perturbées des *Sisymbrietea officinalis*.

Répartition géographique

Plante circumboréale, répandue partout en France, principalement en plaine. Dans le bassin Seine-Normandie, l'espèce est commune et se rencontre sur l'ensemble du territoire, y compris dans les zones les plus urbaines. Elle semble toutefois plus rare dans la Manche.



Sociabilité - Etat des populations - Menaces

La barbarée commune est fréquente dans le bassin Seine-Normandie et n'est par conséquent pas menacée à court ou moyen terme.