



Bidens cernua L., 1753

Bident penché

Famille des Asteraceae

Photo: F. PERRIAT

Liste rouge

NE

Arrêté ZH



Statut

Indigène

Protection

sans objet

Humidité édaphique



Période optimale
d'observation

J F M A M J J A S O N D

Description

Plante annuelle de 10-100 cm de haut, à tige dressée, simple ou rameuse, vert clair, glabre à velue (soies courtes jaunes-verdâtres). Feuilles d'un vert-jaunâtre, indivises, lancéolées, longuement acuminées, sessiles, bordées de dents aiguës. Inflorescence en corymbe lâche, à capitules solitaires, penchés à maturité ; bractées externes foliacées, lancéolées, au nombre de 3-10 ; bractées internes nettement plus courtes, largement ovales, scarieuses et striées de noir. Fleurs généralement toutes tubuleuses, brunâtres ; lorsqu'elles existent, fleurs ligulées jaunes. Fruit : un akène brun, à section losangique à nervures médianes saillantes munies de soies rabattues, à faces plus ou moins lisses et glabres, surmonté de 4 arêtes (parfois 3 ou 5) presque égales.

Confusions possibles

Espèce assez bien caractérisée, à maturité, par ses capitules penchés. L'étude de l'involucre et des akènes doit permettre de bien la distinguer des autres espèces du genre.

Caractères biologiques

Thérophyte.

Caractères écologiques


Espèce hygrophile en conditions mésotrophes à eutrophes, riches en matières organiques sur substrats alluvionnaires ou sur limons : bords d'étangs, rivières, berges de canaux ou de mares et fossés.

Végétations concernées

Espèce présente principalement sur les grèves inondables des cours d'eaux, relevant du *Bidention tripartitae*.

Répartition géographique

Le bident penché est une espèce à répartition holarctique (Europe, Sibérie, Amérique du Nord), présente dans presque toute la France, en dehors de la région méditerranéenne et de la Corse. Elle est globalement bien distribuée sur l'ensemble du bassin Seine-Normandie, tout en restant rare et dispersée. Elle présente une fréquence accrue dans le nord de l'Essonne, dans la Bassée (Seine-et-Marne) jusqu'aux confins de l'Aube, dans la Marne, la Haute-Marne, la partie ouest de la Haute-Normandie, sur les plateaux du Roumois et du Neubourg, et en Picardie, où elle se trouve confinée à quelques mares et bras-morts de la haute vallée de l'Oise, ainsi qu'à quelques très rares étangs du tertiaire parisien.



Sociabilité - Etat des populations - Menaces

Le bident penché est en régression un peu partout, à cause de l'artificialisation des berges des cours d'eau, du reprofilage des berges d'étangs et de l'abandon de la gestion du niveau des étangs (absence de marnage).