



*Bidens tripartita* L., 1753

Bident trifolié

Famille des Asteraceae

Photo: L. BOUDIN

Liste rouge

NE

Arrêté ZH



Statut

Indigène

Protection

sans objet

Humidité édaphique



Période optimale  
d'observation

J F M A M J J A S O N D

## Description

Plante annuelle, haute de 20-50 cm. Tige brun rouge, dressée, à rameaux étalés, presque glabre. Feuilles d'un vert foncé, glabres, opposées, à pétiole court et ailé, fortement dentées, les supérieures tripartites à folioles, sessiles, lancéolés, la médiane plus grande, à dents dirigées en avant, les inférieures indivises. Capitules dressés solitaires, larges de 1-2 cm, 1-1,5 fois aussi larges que hauts, à fleurs jaunes, toutes tubuleuses ; écailles du réceptacle floral linéaires-oblongues. Involucre à 4-8 bractées extérieures foliacées longues de 1-3 cm, les intérieures plus courtes (6-8 mm), ovales-lancéolées, scarieuses, striées de brun. Akènes comprimés oblongs de 5-7,5 mm, cunéiformes, surmontés de 2 ou 3 arêtes subulées, scabres.

## Confusions possibles

Le bident trifolié est proche du bident rayonnant (*Bidens radiata*) mais s'en distingue par ses feuilles à segments foliaires à dents arquées vers l'extérieur, par ses capitules environ aussi longs que larges et surtout par ses akènes longs de 5-7,5 mm pourvus de 2-3 arrêtes. Dans le bassin Seine-Normandie, il n'existe que la sous-espèce nominale (subsp. *tripartita*).

## Caractères biologiques

Thérophyte.

## Caractères écologiques

Espèce héliophile ou en situation semi-ombragée, neutrophile, mésohygrophile à hygrophile, des substrats sableux à vaseux, et riches en éléments nutritifs : grèves d'étangs, canaux et bords de cours d'eau exondés.


## Végétations concernées

Espèce présente dans les groupements de végétations annuelles nitrophiles des vases exondés des *Bidentetea tripartitae* (notamment le *Bidention tripartitae* et le *Chenopodion rubri*).

Espèce présente dans les groupements de végétations annuelles nitrophiles des vases exondées des *Bidentetea tripartitae* (notamment le *Bidention tripartitae* et le *Chenopodion rubri*).

## Répartition géographique

Le bident tripartite est présent dans la plupart des pays d'Europe. En France, il est largement réparti, assez commun dans presque toute la France, mais il se raréfie dans la région méditerranéenne. Dans le bassin Seine-Normandie, il se rencontre fréquemment le long des grandes vallées alluviales (Seine, Marne, Aube, Aisne) ainsi que dans les régions riches en zones humides : massif de Rambouillet, Hurepoix (Île-de-France), Champagne humide, Puisaye (Centre et Yonne), Bocage normand. Il est plus dispersé dans les vallées de l'Oise, de l'Aisne, de la Marne, du bassin de la Souche ou de celui de l'Ourcq (Picardie), dans l'Eure et le pays de Caux (Haute-Normandie).



## Sociabilité - Etat des populations - Menaces

Le bident trifolié est fréquent sur l'ensemble du territoire du bassin Seine-Normandie. Il peut faire localement l'objet d'une concurrence de la part du bident à fruits noirs (*Bidens frondosa*), originaire d'Amérique du Nord, ce qui conduit à un appauvrissement du cortège floristique des groupements de vases exondées auxquels *Bidens tripartita* est associé. Il peut également être menacé par l'artificialisation des berges des cours d'eau, le reprofilage des berges des étangs et leur recreusement, ainsi que par l'abandon de la gestion du niveau des étangs (absence de marnage et d'étiage).