



Salix cinerea L., 1753

Saule cendré

Famille des Salicaceae

Photo: S. FILOCHE

Liste rouge

NE

Arrêté ZH



Statut

Indigène

Protection

sans objet

Humidité édaphique



Période optimale
d'observation

J F M A M J J A S O N D

Description

Arbuste de 2-6 m, à feuilles caduques. Rameaux un peu écartés, peu anguleux, les jeunes et les bourgeons tomenteux-cendrés ; bois de 2-4 ans strié sous l'écorce. Feuilles alternes assez grandes (4-10 cm), pétiolées, obovales ou oblongues-lancéolées (plus grande largeur dans le tiers supérieur), à pointe courte (droite ou un peu déjetée), en coin à la base, un peu ondulées, planes, mates dessus, tomenteuses-cendrées puis glabrescentes à la fin en dessous. Chatons unisexués oblongs ou cylindriques, denses, presque sessiles, à écailles velues, noirâtres au sommet, les mâles à anthères jaunes, les femelles à style court. Fruit : capsule tomenteuse, à long pédicelle.

Confusions possibles

De manière générale, la détermination des saules reste délicate car la morphologie des feuilles varie (forme, pilosité...), non seulement d'un individu à l'autre dans une même population, mais également sur un même sujet. De plus, de nombreux hybrides existent. L'espèce est très proche du Saule à feuilles d'olivier (*Salix atrocinerea*), qui possède à la face inférieure de ses feuilles des poils roux localisés le long des nervures, et du Saule à oreillettes (*Salix aurita*), dont il se distingue par des feuilles plus longues (3-10 cm), non gaufrées à la face supérieure et des rameaux à tomentum persistant plus longtemps.

Caractères biologiques

PhanérophYTE.

Caractères écologiques


Espèce héliophile, hygrophile, à large amplitude trophique, pionnière des substrats marécageux (vaseux, inondés ou tourbeux), basiques à fortement acides : bords des eaux, milieux tourbeux, lisières forestières humides, forêts alluviales, fossés et haies.

Végétations concernées

C'est un arbuste caractéristique des fourrés de saules longuement engorgés du *Salicion cinereae*, ou riverains du *Salici cinereae* - *Rhamnion catharticae*, mais aussi des aulnaies riveraines de l'*Alnion incanae* ou marécageuses de l'*Alnion glutinosae*.

Répartition géographique

Espèce boréo-eurasiatique. En France, l'espèce est très commune sur l'ensemble des zones humides de l'est et du centre du pays, à l'est d'une ligne reliant la Normandie au Limousin et au nord d'une ligne joignant les Cévennes aux Alpes du Nord, en passant par le Dauphiné. Elle est beaucoup plus localisée en région méditerranéenne (Provence, et du Haut-Languedoc à la Cerdagne) et en Corse. Dans le bassin Seine-Normandie, le Saule cendré est omniprésent sur la majeure partie de la dition, en dépit d'un manque de données dans l'Oise. Il se raréfie progressivement en Normandie, où sa présence est plus lacunaire.



Sociabilité - Etat des populations - Menaces

Le Saule cendré est répandu et n'est pas menacé. Il est même en progression, par colonisation des prairies humides abandonnées, qu'il contribue à refermer.