Scutellaria hastifolia L., 1753

Scutellaire à feuilles hastées, Scutellaire hastée

Famille des Lamiaceae

Photo: GUILLAUME THOMASSIN - CBN BRE

Liste rouge: NE

Arrêté ZH: ✓

Statut: ndigène

Protection: Bourgogne

Humidité édaphique

Période optimale d'observation

J F M A M J **J** **A** **S** O N D

Description

Plante vivace, glabrescente haute de 15-50 cm, à souche grêle et traçante. Tiges dressées, simples ou rameuses à la base. Feuilles brièvement pétiolées, lancéolées à ovales ; les moyennes hastées à la base et à 2 petits lobes divariqués, les supérieures étroites et rapprochées. Fleurs disposées à l'aisselle de bractées, en grappes courtes, terminales, unilatérales ; calice de 3-4 mm de longueur, glanduleux-pubescent ; corolle de 15-20 mm de longueur, saillante, d'un bleu violacé, à tube fortement courbé à la base et à lèvre inférieure non tachée de blanc.

Confusions possibles

La Scutellaire à feuilles hastées peut être confondue avec la Scutellaire casquée (*Scutellaria galericulata*), nettement plus répandue, qui présente des feuilles crénelées-dentées, en cœur à la base.

Caractères biologiques

Hémicryptophyte. L'espèce peut se multiplier par ramification de la tige souterraine.

Caractères écologiques

Espèce mésotrophile, neutrocline, des sols sablonneux ou sablo-limoneux, soumis à des inondations régulières, en contexte de grandes vallées alluviales : prairies humides, bords de mares ou de cours d'eaux, fossés.

Végétations concernées

Les végétations concernées par la Scutellaire à feuilles hastées sont variées : prairies humides des *Agrostietea stoloniferae*, communautés d'hélophytes des *Phragmiti australis - Magnocaricetea elatae*, des *Glycerio flutantis - Nasturtietea* et des prairies plus mésophiles des *Arrhenatheretea elatioris*.

Répartition géographique

C'est une espèce méditerranéo-atlantique qui est présente dans presque toute l'Europe, mais de façon discontinue. En France, la Scutellaire à feuilles hastées se rencontre essentiellement dans le bassin de la Loire et dans la vallée de la Saône. Ailleurs, elle est beaucoup plus disséminée (Auvergne, Bretagne, Sud-Ouest). Dans le bassin Seine-Normandie, l'espèce semble avoir disparu.

C'est une espèce méditerranéo-atlantique qui est présente dans presque toute l'Europe, mais de façon discontinue. En France, la Scutellaire à feuilles hastées se rencontre essentiellement dans le bassin de la Loire et dans la vallée de la Saône. Ailleurs, elle est beaucoup plus disséminée (Auvergne, Bretagne, Sud-Ouest). Dans le bassin Seine-Normandie, l'espèce semble avoir disparu.

Sociabilité - Etat des populations - Menaces

La Scutellaire à feuilles hastées est liée à des milieux prairiaux en contexte de vallée alluviale qui sont en forte régression. Le recalibrage des rivières, le drainage des zones humides, la mise en place de digues, l'eutrophisation, la mise en culture des prairies humides, l'abandon des pratiques de fauche et la multiplication des gravières sont autant de facteurs qui expliquent la régression de cette espèce.