Scutellaria minor Huds., 1762

Scutellaire naine, Petite scutellaire

Famille des Lamiaceae

Photo: F. PERRIAT

Liste rouge: NE

Arrêté ZH: ✓

Statut: Indigène

Protection: sans objet

Humidité édaphique

Période optimale d'observation: J F M A M J **J** **A** **S** O N D

Description

Plante vivace de 10-30 cm, presque glabre, à rhizome grêle et traçant. Tige grêle, dressée, à 4 angles, ordinairement rameuse dès la base. Feuilles opposées longues de 2-3 cm, à court pétiole, ovales ou lancéolées, les supérieures et les moyennes tronquées et presque hastées, entières ou à 1-3 paires de dents peu marquées vers la base. Fleurs insérées par 2 à l'aisselle des feuilles, écartées en grappe très lâche unilatérale ; corolle rosée de 6-8 mm, à peine 2 fois plus longue que le calice, à tube droit, un peu ventru à la base ; calice velu, à lèvre supérieure portant sur le dos une écaille creuse formant une bosse.

Confusions possibles

Espèce voisine de la Scutellaire casquée (*Scutellaria galericulata*), qui possède toutefois une corolle plus longue (15-20 mm), bleu violacé, à tube courbé, un calice courtement pubescent et un limbe foliaire à généralement 4-11 paires de dents.

Caractères biologiques

Hélophyte ou hémicryptophyte.

Caractères écologiques

Espèce héliophile ou de demi-ombre, hygrophile, plutôt acidiphile, mésotrophile, liée aux sols mouillés : bas-marais et landes humides, prairies et layons forestiers inondables sur sols acides plutôt dénudés et fossés.

Végétations concernées

La plante s'observe en premier lieu dans les prairies humides acidiphiles oligotrophiles à mésotrophiles du *Juncion acutiflori*, dans les pelouses acidiphiles hygroclines du *Nardo strictae - Juncion squarrosi*, ou plus rarement dans des aulnaies marécageuses de l'*Alnion glutinosae*.

Répartition géographique

Espèce subatlantique. En France, elle est principalement distribuée dans l'ouest et le centre du pays, jusque dans le bassin de la Saône à l'est. Elle est plus rare dans le Sud-Ouest, le Nord-Est et absente dans le Sud-Est et en Corse. Dans le bassin Seine-Normandie, l'espèce est presque uniquement

connue de la Manche au Morvan, où elle est assez régulière : Basse-Normandie, Perche, Orléanais, Puisaye, Morvan. Elle est également bien représentée en Île-de-France dans le massif de Rambouillet, le Hurepoix, la Brie, dans la plaine de Bière (Seine-et-Marne) et sur les buttes du Vexin. Elle reste très sporadique ailleurs et totalement absente des secteurs calcaires.

Sociabilité - Etat des populations - Menaces

La Scutellaire naine est répandue dans les secteurs aux sols favorables et n'est globalement pas menacée. En revanche, en dehors de ses secteurs de prédilection, la plante présente souvent des effectifs réduits et liés à des sites ponctuels, pouvant potentiellement faire l'objet de dégradations.