

Scorzonera humilis L., 1753

Scorsonère des prés, Petit scorsonère, Scorsonère

Famille des Asteraceae

Photo: F. PERRIAT

Liste rouge: NE

Arrêté ZH: ✓

Statut: Indigène

Protection: sans objet

Humidité édaphique

Période optimale d'observation: J F M A **M** **J** J A S O N D

Description

Plante vivace à tige dressée de 10-60 cm, molle, creuse, glabre ou un peu cotonneuse au sommet. Feuilles entières, presque toutes en rosette basilaire, le plus souvent lancéolées ou lancéolées-linéaires, atténuées aux deux bouts, à 5-7 nervures longitudinales ; 2-4 feuilles sessiles et linéaires sur la tige. Capitule généralement solitaire terminant la tige, large de 2-3 cm, à fleurs jaunes toutes en languette ; involucre à bractées internes plus longues que les externes, en général cotonneux à la base. Fruit : akènes allongés à aigrette blanc sale.

Confusions possibles

A l'état végétatif, risque de confusion avec le Plantain lancéolé (*Plantago lanceolata*), qui présente également des feuilles à 5-7 nervures.

Caractères biologiques

Hémicryptophyte.

Caractères écologiques

Espèce héliophile, mésohygrophile à hygrophile, neutrophile à acidiphile, oligotrophile à mésotrophile, des sols humides à frais et soumis à des variations d'humidité au cours de l'année : prairies humides à tourbeuses, landes humides et tourbières évoluées.

Végétations concernées

La plante se rencontre dans les prairies pauvres en nutriments sur sols tourbeux à paratourbeux des *Molinietalia caeruleae*, en particulier dans les communautés acidiphiles du *Juncion acutiflori*.

Répartition géographique

Espèce eurasiatique, largement distribuée dans l'ouest et le centre de la France, du massif armoricain au sud du Massif central (Cévennes), jusqu'au Morvan et à la Manche. Elle est également bien représentée dans l'Est (de l'Ain aux Vosges), mais très rare et localisée dans le Sud-Ouest : massif landais, Haut-Languedoc et Pyrénées (Cerdagne principalement). Elle est totalement absente en région médietrranéenne et en Corse. Dans le bassin Seine-Normandie, l'espèce est présente principalement en

Basse-Normandie (avec des lacunes dans la Manche), dans le Bessin et autour de Caen. Ailleurs, elle est dispersée en Île-de-France dans le massif de Rambouillet, sur les marges du plateau de Brie, dans l'Orléanais, l'Yonne, le long de l'Arc humide de Champagne, dans le Morvan et le Langrois. Elle est très ponctuelle ailleurs, avec de grandes lacunes.

Sociabilité - Etat des populations - Menaces

Le Scorsonère des prés se maintient dans ses principaux bastions sur sols siliceux ou cristallins, mais il n'en est pas de même pour les populations isolées, qui souffrent fortement de l'abandon des pratiques pastorales extensives de gestion (fauchage ou pacage ovin), de l'eutrophisation ou du drainage des agrosystèmes pastoraux humides.