Schoenoplectus tabernaemontani (C.C.Gmel.)

Jonc des chaisiers glauque

Famille des Cyperaceae

Photo: F. PERRIAT

Liste rouge: NE

Arrêté ZH: ✓

Statut: Indigène

Protection: Centre-Val de Loire

Humidité édaphique

Période optimale d'observation: J F M A M J J A S O N D

Description

Plante vivace, haute de 50-150 cm. Tiges arrondies, glauques, entourées de gaines foliaires, les supérieures pouvant être prolongées par un limbe généralement court et de section circulaire. Inflorescence en tête dense ; bractée petite, unique, ne prolongeant pas la tige ; écailles des fleurs ponctuées de rouge, un peu rugueuses, finement ciliées sur les bords ; deux stigmates ; anthères glabres à l'extrémité. Fruit : akène obovale, fortement bombé sur une face, convexe sur l'autre, à dents ne dépassant pas l'akène.

Confusions possibles

C'est une espèce semblable au Jonc des chaisiers (*Schoenoplectus lacustris*), parfois considérée comme une sous-espèce de ce dernier. La distinction entre les deux espèces se porte sur la couleur de la tige (vert glauque pour *S. tabernaemontani*, vert franc pour *S. lacustris* et surtout sur l'écaille florale et le nombre de stigmates (écaille lisse et généralement 3 stigmates pour *S. lacustris* ; écaille papilleuse et 2 stigmates pour *S. tabernaemontani*).

Caractères biologiques

Hélophyte. La tige souterraine se ramifie, ce qui permet à la plante de se multiplier.

Caractères écologiques

Espèce eutrophile, basiphile, des substrats tourbeux, régulièrement inondés : ceintures d'étangs, bords de rivières à cours lent, marais. Elle se trouve souvent en eaux saumâtres, mais aussi à l'intérieur des terres.

Végétations concernées

Espèce présente dans les roselières de ceinture d'étangs ou de bords de cours d'eau à courant faible des *Phragmitetalia australis*, ou parfois dans les bas-marais alcalins de l'*Hydrocotylo vulgaris - Schoenion nigricantis*.

Répartition géographique

Espèce cosmopolite, présente dans toute l'Europe et plus particulièrement dans le nord. Le Jonc des chaisiers glauque est largement distribué en France mais sa répartition est inégale puisqu'il est absent du Sud-Ouest, du Limousin d'une partie du Massif central et de la Franche-Comté. Dans le bassin Seine-Normandie, l'espèce est très rare et répartie sous forme de quelques stations très dispersées, en Île-de-France, en Champagne-Ardenne, en Haute-Normandie (en particulier dans l'estuaire de la Seine, le Marais Vernier et dans l'embouchure de quelques fleuves du littoral cauchois), en Basse-Normandie (sur le littoral de la Manche) ainsi que dans les départements de l'Yonne, du Loiret, de l'Oise et de l'Aisne.

Sociabilité - Etat des populations - Menaces

Le Jonc des chaisiers glauque est menacé principalement par toute dégradation de son biotope (abandon des pratiques pastorales, modification du régime hydrologique, drainage et transformation en peupleraies ou en cultures, eutrophisation des eaux).