Scirpus sylvaticus L., 1753

Scirpe des bois, Scirpe des forêts

Famille des Cyperaceae

Photo: S. FILOCHE

Liste rouge: NE

Arrêté ZH: ✓

Statut: Indigène

Protection: sans objet

Humidité édaphique

Période optimale d'observation: J F M A M J J A S O N D

Description

Plante vivace de 50-100 cm, glabre, à rhizome rampant. Tiges solitaires, robustes, dressées, trigones à faces convexes, lisses, feuillées. Feuilles longues, larges de 8-15 mm, planes ou légèrement pliées, rudes aux bords et à la nervure principale. Inflorescence en grande panicule ample composée, non ou peu dépassée par 2-3 bractées, réunissant des petits glomérules d'épillets verts ou vert-bruns, presque tous sessiles, longs de 3-4 mm, ovoïdes ; écailles obtuses terminées par un mucron ; 3 stigmates. Fruit : akène à 3 angles entouré de 6 soies scabres l'égalant.

Confusions possibles

Risque de confusion très élevé, à l'état végétatif, avec des grands *Carex*, qui possèdent néanmoins une tige moins feuillée.

Caractères biologiques

Géophyte à rhizome ou hélophyte.

Caractères écologiques

Espèce héliophile ou de demi-ombre, mésohygrophile, eutrophile, des sols humides à mouillés, neutres à moyennement acides, argileux ou limoneux : prairies hygrophiles, roselières, mégaphorbiaies, forêts hygrophiles et leurs lisières, suintements, fossés, bords des eaux (étangs).

Végétations concernées

L'espèce est présente dans une grande variété de milieux, allant des prairies hygrophiles et mégaphorbiaies du *Calthion palustris* et de l'*Achilleo ptarmicae - Cirsion palustris*, en contexte alluvial ou en situation intraforestière, aux suintements et sous-bois de forêts hygrophiles riveraines de l'*Alnion incanae* ou marécageuses de l'*Alnion glutinosae*. Elle se trouve plus rarement en bordure des eaux du *Glycerio fluitantis - Sparganion neglecti* ou dans les ourlets herbacés intraforestiers de l'*Impatienti noli-tangere - Stachyion sylvaticae*.

Répartition géographique

Espèce circumboréale. En France, elle est largement distribuée dans leMMassif central, en Bourgogne, dans les Alpes du Nord, les Ardennes, l'Orléanais, et dans les régions riches en étangs (Puisaye, Bresse, plateau des mille étangs entre Vosges et Jura). Elle est plus rare ailleurs. Dans le bassin Seine-Normandie, l'espèce est inégalement répartie, avec une fréquence maximale en Basse-Normandie, à l'exception du nord de la Manche, dans l'ouest de l'Île-de-France, le Soissonnais, la Thiérache, le long de l'arc humide de Champagne, dans le Morvan, en Puisaye, sur les plateaux de Bourgogne, dans l'Orléanais, le Lieuvin et le nord-est de la Haute-Normandie. Ailleurs, elle est relativement dispersée, avec toutefois un manque de données dans l'Oise.

Sociabilité - Etat des populations - Menaces

Le Scirpe des bois forme en général de grandes colonies et peut rapidement coloniser un milieu favorable du fait de son rhizome traçant. Il s'observe dans une grande diversité de milieux humides, ce qui lui offre des possibilités de colonisation en cas de perturbation de son habitat d'origine.