Scutellaria galericulata L., 1753

Scutellaire casquée

Famille des Lamiaceae

Photo: S. FILOCHE

Liste rouge	Arrêté ZH
NE	✓

Statut

Indigène

Protection

sans objet

Humidité édaphique

Période optimale d'observation

J F M A M J J A S O N D

Description

Plante vivace de 20-80 cm, à souche longuement traçante. Tige raide à 4 angles, dressée ou ascendante, simple ou rameuse, pubescente ou presque glabre. Feuilles opposées longues de 3-4 cm, à court pétiole, oblongues-lancéolées, en coeur à la base, bordées de crénelures superficielles (4-11 paires de dents obtuses). Fleurs solitaires ou groupées par deux à l'aisselle des feuilles moyennes et supérieures, bleues ou violacées, assez grandes, unilatérales ; calice glabre, souvent glanduleux, à 2 lèvres (la supérieure portant sur le dos une écaille creuse formant une bosse) ; corolle de 10-15 mm, 4-5 fois plus longue que le calice, à tube arqué-ascendant vers la base.

Confusions possibles

La Scutellaire casquée ne doit pas être confondue avec la Scutellaire naine (*Scutellaria minor*), aux fleurs plus petites (corolle de 6-7 mm), rose pâle et aux feuilles entières ou à 1-3 paires de dents peu marquées. Elle peut aussi être confondue avec la Scutellaire hastée (*Scutellaria hastifolia*), mais la Scutellaire casquée, plus répandue, présente des feuilles crénelées-dentées, en cœur à la base.

Caractères biologiques

Hélophyte ou hémicryptophyte.

Caractères écologiques

Espèce héliophile ou de demi-ombre, hygrophile, neutro-acidicline, des sols mouillés et inondables, plus ou moins riches en éléments nutritifs, argileux ou tourbeux : bords des eaux, prairies humides, forêts alluviales ou hygrophiles, fossés, tourbières.

Végétations concernées

Espèce que l'on rencontre dans les roselières et grandes cariçaies hygrophiles des *Phragmito australis - Magnocaricetea elatae*, et les forêts et fourrés sur sols marécageux des *Alnetea glutinosae*.

Répartition géographique

Espèce boréo-eurasiatique, circumboréale, largement distribuée dans la moitié nord de la France, avec toutefois des lacunes dans l'extrême nord. Elle est nettement plus rare encore dans la moitié sud, où la

plante se cantonne aux vallées des principaux cours d'eau et reste presque totalement absente de la région méditerranéenne. Dans le bassin Seine-Normandie, sa distribution est assez homogène, à l'exception d'une fréquence moindre sur les plateaux agricoles pauvres en milieux humides.

Sociabilité - Etat des populations - Menaces

Espèce non menacée en raison de sa large répartition, des effectifs souvent conséquents de ses populations et de la diversité des milieux qui lui sont favorables.