



Thalictrum flavum L., 1753

Pigamon jaune

Famille des Ranunculaceae

Photo: F. PERRIAT

Liste rouge

NE

Arrêté ZH



Statut

Indigène

Protection

Centre-Val de Loire

Humidité édaphique



Période optimale
d'observation

J F M A M J J A S O N D

Description

Plante vivace de 50-150 cm de hauteur à tige souterraine stolonifère à nombreuses racines adventives. Tige florifère dressée, glabre, non luisante, cannelée et creuse. Feuilles alternes, engainantes, bi à tripennées, à limbe plus long que large ; folioles oblongues en coin, généralement trilobées (parfois entières), plus longues que larges ; pétioles souvent munis de stipules. Inflorescence en panicule serré, formée de fleurs réunies en glomérules denses ; pédoncules courts ; fleurs jaunâtres, à tépales courts et caducs ; étamines très nombreuses, jaunes, saillantes, dressées ou un peu inclinées, à anthères mutiques. Fruit : akènes courts, ovoïdes ou arrondis, très obtus, glabres et à côtes peu saillantes.

Confusions possibles

Espèce très polymorphe mais d'identification simple.

Caractères biologiques

Hémicryptophyte érigé. Les racines, toxiques et tinctoriales, donnent une couleur jaunâtre.

Caractères écologiques

Espèce héliophile et hygrophile des alluvions plus ou moins tourbeuses, en conditions mésotrophiles : prairies humides à hautes herbes, bas-marais, roselières, boisements alluviaux, bords des eaux et fossés.


Végétations concernées

Espèce présente presque exclusivement dans les mégaphorbiaies mésotrophiles du *Thalictrum flavum* - *Filipendula ulmariae*, mais aussi dans des prairies alluviales humides du *Bromion racemosi* ou du *Molinion caeruleae*.

Répartition géographique

Le Pigamon jaune est présent dans presque toute l'Europe (en dehors de la Grèce). Il se rencontre dans presque tout le territoire français, tout en restant rare dans les Alpes, le Massif central, les Pyrénées, le

Sud-Ouest (Aquitaine et Midi-Pyrénées), en Bretagne et absent en Corse. Dans le bassin Seine-Normandie, il est réparti sur l'ensemble des départements, y compris urbains, avec néanmoins des fréquences inégales. Il est particulièrement bien représenté dans les grandes vallées de la Marne, de la Seine, de l'Orne, de l'Oise et ses affluents, dans les grands marais du Cotentin (Manche) et de la Dives (Calvados), ainsi que dans les marais de pied de cuestas (Aisne, Oise), les vallées de l'Epte, de l'Eure, de l'Iton, de l'Avre, de la Risle, de la Charentonne (Eure). Il est plus disséminé ailleurs, avec localement de vastes lacunes.



Sociabilité - Etat des populations - Menaces

Espèce qui se maintient bien, capable de s'adapter à la dégradation des bords de cours d'eau ou des milieux marécageux? En trouvant refuge dans des milieux transitoires (prairies humides abandonnées et irrégulièrement fauchées, berges de cours d'eau et canaux, fossés).