



Symphytum officinale L., 1753

Grande consoude

Famille des Boraginaceae

Photo: F. PERRIAT

Liste rouge

NE

Arrêté ZH



Statut

Indigène

Protection

sans objet

Humidité édaphique



Période optimale
d'observation

J F M A M J J A S O N D

Description

Plante vivace de 30-100 cm à souche épaisse, renflée en fuseau charnu, mais non tubéreuse. Tige robuste, velue-hérissée de poils raides, ailée, anguleuse, ramifiée dans la partie supérieure. Feuilles épaisses, ovales-lancéolées, les inférieures longues de 20-80 cm et plus grandes que les moyennes longuement décurrentes (sur plus d'un entre-nœud). Inflorescences en cymes scorpioides de fleurs blanchâtres, rosées ou violettes, à corolle d'environ 15 mm de long, 2 fois plus longue que le calice, à lobes réfléchis et pointus ; calice fendu presque jusqu'à la base et à lobes pointus ; anthères aiguës, un peu plus longues que le filet. Fruit : carpelles lisses, luisants, non contractés au-dessus de la base.

Confusions possibles

L'espèce ne présente pas de difficultés particulières de détermination.

Caractères biologiques

Hémicryptophyte.

Caractères écologiques

Espèce héliophile ou de demi-ombre, hygrophile, eutrophile, nitrophile, neutrophile à basiphile des sols mouillés ou pouvant présenter des variations d'humidité au cours de l'année : bords des eaux, mégaphorbiaies, prairies humides, forêts alluviales (layons) et lisières associées.


Végétations concernées

L'espèce s'observe dans une grande diversité de milieux humides, mais principalement dans les mégaphorbiaies des *Filipendulo ulmariae* - *Convolvuletea sepium*, dans les ourlets nitrophiles mésophiles à mésohygrophiles de l'*Aegopodion podagrariae* ou dans des forêts riveraines de l'*Alnion incanae* ou marécageuses de l'*Alnion glutinosae*.

Répartition géographique

Espèce eurasiatique-subocéanique (dispersée). En France, elle est très fréquente dans la moitié nord du pays, sauf dans les régions dont les sols sont pauvres et acides (Bretagne) ou secs. Elle est plus

disséminée voir absente dans le sud de la France et en altitude. Dans le bassin Seine-Normandie, la Grande consoude est commune sur l'ensemble du territoire, sauf dans les secteurs pauvres en milieux humides (est de la dition principalement : plateaux de l'Yonne et de Champagne). La répartition souffre d'un manque de données dans l'Oise.



Sociabilité - Etat des populations - Menaces

La Grande consoude est une espèce très commune presque partout, sociable et favorisée par les activités humaines, qui contribuent à l'enrichissement des milieux naturels en éléments azotés.