



**Teucrium scordium L., 1753**

Germadrée des marais

Famille des Lamiaceae

Photo: F. PERRIAT

Liste rouge

NE

Arrêté ZH



Statut

Indigène

Protection

Champagne-Ardenne, Centre-Val  
de Loire, Picardie

Humidité édaphique



Période optimale  
d'observation

J F M A M J J A S O N D

## Description

Plante vivace, 10-50 cm de hauteur, toute velue-grisâtre, à odeur alliacée, à souche rampante émettant des stolons écailleux ou munis de petites feuilles. Tiges couchées-radicantes, puis redressées, entièrement herbacées. Feuilles molles, sessiles ou subsessiles, oblongues, dentées ou crénelées, les florales à peine différentes. Fleurs axillaires, courtement pédicellées, verticillées par 2-4, tournées du même côté ; bractées foliacées ; calice velu-laineux, ventru, sans anneau de poils à la gorge, à dents égales, lancéolées-acuminées ; corolle purpurine (7-10 mm) environ 2 fois plus longue que le calice. Fruit : akène long de 1-1,5 mm à veines saillantes.

## Confusions possibles

Pas de confusion possible avec d'autres espèces. Deux sous-espèces sont connues : la subsp. *scordium* et la subsp. *scodioides*.

## Caractères biologiques

Hémicryptophyte à stolons. Espèce à multiplication végétative importante pouvant former des populations denses. Plante médicinale et tinctoriale (vert-jaunâtre), parfois cultivée comme plante ornementale.

## Caractères écologiques


Plante héliophile ou de demi-ombre, hygrophile, des substrats proches de la neutralité (peu acides à alcalins) et mésotrophes, souvent plus ou moins tourbeux ou organiques et engorgés (battements de nappes) : prairies humides de fauche inondables sur alluvions, berges et queues d'étangs, mares forestières, dépressions inondables des dunes (pannes), fossés et chenaux.

## Végétations concernées

Espèce présente principalement dans les prairies humides des *Agrostietea stoloniferae*, notamment dans le *Bromion racemosi*, l'*Oenanthon fistulosae*, et dans des zones plus tassées du *Potentillion anserinae*. De façon secondaire, elle se trouve dans les prairies maigres du *Molinion caeruleae* mais aussi dans le *Magnocaricion elatae*.

## Répartition géographique

Espèce présente en Europe, Asie occidentale et Afrique du nord. En France, la Germandrée des marais est disséminée par petites populations dans une grande partie du territoire, surtout aux étages planitaires, avec cependant de vastes lacunes dans le Massif central et le Sud-Ouest (Midi-Pyrénées et Aquitaine notamment). Dans le bassin Seine-Normandie, elle est régulièrement présente sous forme de noyaux de populations : Orléanais, Champagne humide, Bassée, marges du plateau de Brie, Champagne crayeuse (de la Haute-Marne à la Seine-et-Marne), moyenne vallée inondable de l'Oise et dans l'Orne. Seule la subsp. *scordioides* est présente sur le littoral de la Manche, où elle reste rare.



## Sociabilité - Etat des populations - Menaces

L'évolution des populations est variable en fonction des régions mais l'espèce semble en régression sur l'ensemble du bassin Seine-Normandie. Elle est principalement victime de la régression des zones humides, notamment des milieux prairiaux, suite au drainage, au comblement des mares et à l'intensification des pratiques agricoles (mise en culture).