



Ulex minor Roth, 1797

Ajonc nain, Petit ajonc, Petit Landin

Famille des Fabaceae

Photo: S. FILOCHE

Liste rouge

NE

Arrêté ZH



Statut

Indigène

Protection

Bourgogne, Picardie

Humidité édaphique



Période optimale
d'observation

J F M A M J J A S O N D

Description

Arbousseau toujours vert de 30-80 cm de haut, à rameaux couchés-ascendants, vert sombres, brillants et densément pubescents. Rameaux munis d'épines d'environ 3-9 mm de long, droites ou légèrement arquées, très denses, souples et peu piquantes. Feuilles absentes, transformées en épines. Fleurs à pédoncule de 3-5 mm de long à poils appliqués, solitaires ou disposées par deux, longues de 7-9 mm, à corolle d'un jaune citron, à étendard longuement veiné de rouge et à ailes plus courtes que la carène courbée ; calice muni de poils épars, appliqués, blancs-jaunâtres ; bractéoles lancéolées pubescentes. Fruit : gousse ovale-rhomboidale, large de 4 mm velue, plus courte que le calice, à 4 graines.

Confusions possibles

Dans la dition, les seules confusions possibles pourraient être celles avec des individus fauchés d'Ajonc d'Europe (*Ulex europaeus*), à épines plus fortes et plus grandes (2-4 cm).

Caractères biologiques

Nanophanérophyte.

Caractères écologiques

Espèce héliophile, acidiphile, oligotrophile, mésophile à hygrophile des sols composés de matériaux grossiers (granite, sables, tourbe) : landes atlantiques humides et mésophiles.


Végétations concernées

L'espèce est une des composantes majeures des landes oligotrophiles mésophiles à mésohygrophiles de l'*Ulicion minoris*. Elle se trouve également en contexte anthropisé dans des ourlets développés sur des talus secs de routes, souvent adossés à des boisements des *Melampyro pratensis* - *Holcetea mollis*.

Répartition géographique

Espèce atlantique. En France, elle est présente dans une grande partie de l'ouest et du centre du pays, jusque dans l'ouest de la Bourgogne et aux environs de Lyon à l'est, et en Île-de-France au nord (avec d'ultimes populations en Haute-Normandie). Dans le bassin Seine-Normandie, l'espèce est essentiellement limitée au centre du territoire, du Perche à l'Orléanais et à la Puisaye, en passant par le

Hurepoix et le massif de Rambouillet, ainsi que par le nord de la vallée du Loing et la Plaine de Bière. En Normandie, elle est très dispersée et ponctuelle dans quelques localités.



Sociabilité - Etat des populations - Menaces

Cette espèce peut se rencontrer en populations très denses et importantes. Elle se maintient globalement bien mais semble cependant en régression sur les marges de son aire de répartition, ainsi que dans les régions fortement urbanisées (Île-de-France). C'est une plante menacée par la fermeture de ses milieux, suite à l'abandon du pâturage des landes, et dans de nombreux cas, par le drainage. En outre, les landes atlantiques bien structurées présentent désormais des surfaces très restreintes et l'espèce se rencontre souvent dans des habitats de substitution régulièrement entretenus par un broyage mécanique.