



Trifolium patens Schreb., 1804

Trèfle étalé

Famille des Fabaceae

Photo: G. HUNAU

Liste rouge

NE

Arrêté ZH



Statut

Indigène

Protection

sans objet

Humidité édaphique



Période optimale
d'observation

J F M A M J J A S O N D

Description

Plante annuelle de 30-60 cm de hauteur, pubescente. Tiges flexueuses, grêles, dressées ou ascendantes. Feuilles trifoliées, à folioles obovales ou oblongues-elliptiques, denticulées vers le haut, la médiane généralement pétiolulée ; stipules ovales-lancéolées, aiguës, élargies en cœur à la base, dentées vers l'extrémité, plus courtes que le pétiole. Inflorescence subglobuleuse petite (5-6 mm de long), assez lâche, comprenant 10-18 fleurs jaune foncé ; pédoncule axillaire, filiforme, nettement plus long que la feuille correspondante ; pédicelles courts, réfléchis à leur extrémité ; calice glabre à dents très inégales, les inférieures plus longues que le tube ; corolle dépassant le calice à étendard strié, étalé, plus long que les ailes divergentes ; style presque aussi long que la gousse. Fruit : gousse.

Confusions possibles

Le Trèfle étalé est proche du Trèfle des champs (*Trifolium campestre*) mais s'en distingue par son inflorescence à pédoncule nettement plus long que la feuille axillante et par son style presque aussi long que la gousse. Des confusions sont aussi possibles avec le trèfle doré (*Trifolium aureum*) mais celui-ci présente des folioles sessiles et des stipules lancéolées non élargies à la base.

Caractères biologiques

Thérophyte.

Caractères écologiques

Espèce héliophile, mésohygrophile, neutrocline à basiphile des prairies fraîches ou humides.


Végétations concernées

Espèce typique des prairies humides soumises à des inondations de courte durée des *Agrostietea stoloniferae*, en particulier dans le *Bromion racemosi* et l'*Alopecurion utriculati*.

Répartition géographique

Le Trèfle étalé est largement réparti en France mais de manière inégale. Il est surtout présent dans l'Ouest, le Massif central, le Jura et disséminé dans le reste du territoire en étant très rare dans le Nord

(absent du Nord-Pas-de-Calais, et du nord de la Lorraine) et en région méditerranéenne. Dans le bassin Seine-Normandie, l'espèce est très rare, principalement localisée en Champagne humide et dans les marais arrière-littoraux de la Manche. Elle est très disséminée dans le Loiret et la Nièvre et a disparu de nombreuses régions (Picardie, Île-de-France).



Sociabilité - Etat des populations - Menaces

Cette espèce a parfois un comportement d'adventice et peut se rencontrer dans des milieux secondaires tels que des bords de routes ou des décombres. Cette espèce en forte régression est menacée d'une part par la destruction de ses milieux par drainage ou par assèchement, et d'autre part par la déprise agricole et la disparition des pratiques traditionnelles d'élevage, qui entraînent l'abandon des prairies.