



Triglochin palustre L., 1753

Troschart des marais

Famille des Juncaginaceae

Photo: F. PERRIAT

Liste rouge

NE

Arrêté ZH



Statut

Indigène

Protection

Centre-Val de Loire, Haute-Normandie

Humidité édaphique



Période optimale d'observation

J F M A M J J A S O N D

Description

Plante vivace, glabre, haute de 20-60 cm, à souche écailleuse à peine renflée, d'où partent des stolons grêles. Feuilles toutes basales, linéaires, semi-cylindriques, larges de 1-2 mm et longues de 20-30 cm ; ligule ovale-triangulaire aussi longue que large. Tige florifère unique, portant une longue grappe spiciforme, multiflore, très étroite, dépassant les feuilles ; fleurs petites, jaune-verdâtres ; périanthe formé de 6 tépales semblables, rapidement caducs ; 6 étamines ; 3 stigmates et 3 carpelles ; pédicelle fructifère longuement dressé, plus court que le fruit. Fruit : carpelles formant une capsule allongée, atténuée à la base, appliquée contre l'axe, de 8-10 mm de long et environ 1 mm de large.

Confusions possibles

Le Troschart des marais (*Triglochin palustre*) peut-être parfois confondu avec les autres espèces du genre, notamment avec le Troschart maritime (*Triglochin maritimum*), qui possède des fruits non appliqués contre l'axe de l'inflorescence et formés de six carpelles. Le risque de confusion est élevé à l'état végétatif en raison de son aspect junciforme.

Caractères biologiques

Hémicryptophyte.

Caractères écologiques

Espèce oligotrophile, neutrophile à basiphile, des substrats argileux à tourbeux : prairies marécageuses ou tourbeuses, dépressions et fossés de bas-marais en contact de suintements et de ruisseaux et parfois aussi en milieu saumâtre.


Végétations concernées

Espèce présente essentiellement dans les végétations de bas-marais sur sols tourbeux oligotrophes des *Scheuchzerio palustris* - *Caricetea fuscae*, en particulier dans le *Caricion lasiocarpae*) et dans les prairies humides oligotrophes sur sols paratourbeux à minéral, basiques, du *Molinion caeruleae*.

Répartition géographique

Espèce holarctique, présente dans une grande partie de l'Europe, mais surtout dans les régions froides

septentrionales ou montagneuses. En France, le troscart des marais est disséminé sur une grande partie du territoire, mais reste rare et toujours localisé. Dans le bassin Seine-Normandie, il subsiste sur le littoral de la Manche, ponctuellement dans l'Orne et le Calvados, sur le plateau de Langres et dans le Châtillonnais, dans quelques localités dans le Clermontois, le Valois et le Laonnois. Il est exceptionnel en Île-de-France (une donnée dans le val d'Oise).



Sociabilité - Etat des populations - Menaces

Espèce souvent disséminée, mais qui peut former des populations importantes localement (bas-marais littoraux, montagnes). En forte régression, le Troscart des marais est menacé du fait de l'arrêt des pratiques agricoles traditionnelles (pâturage extensif, fauche régulière d'automne), du drainage, et de l'eutrophisation de ses milieux.