



Trifolium ornithopodioides L., 1753

Trèfle faux Pied-d'oiseau

Famille des Fabaceae

Photo: F. PERRIAT

Liste rouge

Arrêté ZH

NE



Statut

Indigène

Protection

Île-de-France

Humidité édaphique



Période optimale
d'observation

J F M A M J J A S O N D

Description

Plante annuelle, glabre haute de 5-10 cm, couchée-étalée. Feuilles longuement pétiolées (le pétiole plus long que les folioles), les supérieures entourant les fleurs assez étroitement, trifoliées : folioles de 4-10 mm, obovales en coin, tronquées, denticulées dans le haut, brièvement pétiolulées et glabres ; stipules entiers. Inflorescence en tête à 1-3 fleurs petites, rougeâtres à jaune rougeâtre, portées par des pédoncules axillaires beaucoup plus courts que la feuille ; calice à dents presque égales, plus longues que le tube ; corolle marcescente, de 6-8 mm. Fruit : gousse de 6-8 mm, linéaire oblongue, un peu arquée au sommet, sans nervures, dépassant légèrement le calice à maturité, légèrement pubescente, contenant 5-9 graines.

Confusions possibles

Les confusions sont possibles avec le Trèfle souterrain (*Trifolium subterraneum*), surtout à l'état végétatif. Le Trèfle faux pied-d'oiseau se différencie par des feuilles glabres, par une inflorescence munie de bractées et dépourvue de fleurs stériles, à pédoncule restant dressé après l'anthèse et par des gousses dépassant le calice à maturité.

Caractères biologiques

Thérophyte. Plante autogame.

Caractères écologiques

Espèce héliophile, psammophile, des milieux ouverts temporairement inondés sur substrats acides oligotrophes : pelouses sableuses rases, pannes dunaires, platières sur schistes ou sur grès.


Végétations concernées

Espèce essentiellement présente dans des groupements de gazons pionniers sur sables et argiles humides acides des *Nanocyperetalia flavescentis*.

Répartition géographique

Espèce de répartition méditerranéo-atlantique, que l'on rencontre essentiellement dans les plaines d'Europe occidentale, surtout sur le littoral, du Portugal au Danemark, en Grande-Bretagne, dans

quelques îles de la Baltique et en Italie. En France, elle est surtout distribuée dans l'Ouest, disséminée sur le littoral Atlantique (Bretagne, Pays-de-la-Loire, Charentes-maritimes et Aquitaine) et de la Manche, mais présente aussi sur les plateaux basaltiques d'Auvergne, dans le Bassin parisien, le Centre, le Nord, sur la façade méditerranéenne et en Corse, où elle est rare. Dans le bassin Seine-Normandie, le Trèfle faux pied-d'oiseau est très rare et strictement localisé à quelques communes du littoral de la Manche et au massif de Fontainebleau.



Sociabilité - Etat des populations - Menaces

La plante ne forme jamais des populations étendues. Sa petite taille et son caractère éphémère peuvent rendre la plante difficilement observable. Par ailleurs, en fonction des conditions écologiques et climatiques, elle peut même disparaître certaines années, pour réapparaître ensuite. Le Trèfle pied-d'oiseau s'est fortement raréfié, en particulier dans le nord de son aire de distribution. Il est par conséquent, vulnérable à tout type de modification apportée à son milieu : eutrophisation des eaux de la nappe, assèchement temporaire (année sèche) ou définitif (drainage), densification du couvert végétal ou concurrence par une ou plusieurs espèces à forte dynamique.