Photo: F. PERRIAT

Plantago major subsp. pleiosperma Pilg., 1937

Plantain intermédiaire

Famille des Plantaginaceae

Liste rouge	Arrêté ZH
NE	✓

Statut

Indigène

Protection

sans objet

Humidité édaphique

Période optimale d'observation

J F M A M **J** **J** **A** **S** O N D

Description

Plante vivace de 10-30 cm, presque glabre ou pubescente, à souche courte. Feuilles toutes en rosette, épaisses, largement ovales, à pétiole assez long, un peu ailé et bien plus large que les hampes, à 5-9 fortes nervures. Hampe florifère dressée ou ascendante, en épi allongé, cylindrique, un peu lâche à la base, non strié, égalant à peine ou dépassant les feuilles ; bractées ovales-obtuses, faiblement scarieuses, vertes sur le dos, égalant la moitié des sépales arrondis ; corolle grisâtre, glabre, à lobes obtus ; anthères brunes, à filets brièvement saillants. Fruit : capsule bien développée contenant en majorité plus de 13 graines, ces dernières petites, anguleuses et de moins de 1,2 mm de long à maturité.

Confusions possibles

Sous-espèce très proche et parfois difficile à différencier de la sous-espèce type (*Plantago major* subsp. *major*), dont le seul critère fiable d'identification est fondé sur le nombre, la forme et la taille des graines contenues par les capsusles (5-13 graines majoritairement subovoïdes et de moins de 1,2 mm chez le Plantain majeur).

Caractères biologiques

Hémicryptophyte.

Caractères écologiques

Taxon mésohygrophile, des substrats riches en éléments nutritifs, basiques à faiblement acides, soumis à une battance de nappe : prairies ouvertes dégradées, berges exondées, dépressions inondables (dont mouillères) et, en second lieu, dans des habitats fortement anthropisés (villages, chemins, cultures).

Végétations concernées

Taxon essentiellement lié aux prairies piétinées et eutrophiles du *Potentillion anserinae*, et aux groupements pionniers des dépressions humides des *Nanocyperetalia flavescentis*.

Taxon essentiellement lié aux prairies piétinées et eutrophiles du *Potentillion anserinae*, et aux groupements pionniers des dépressions humides des *Nanocyperetalia flavescentis*.

Répartition géographique

Taxon eurasiatique, distribué en France dans tout le pays, avec une fréquence très inégale, plus élevée dans la moitié nord, notamment dans le bassin de la Loire, dans la plaine d'Alsace et sur le littoral atlantique. Dans le bassin Seine-Normandie, le taxon est bien représenté en Île-de-France et au sud de la Seine dans l'Orléanais et en Puisaye, le long de l'arc humide de Champagne, dans les Ardennes, le Calvados et le long des vallées de la Seine et de l'Oise.



Sociabilité - Etat des populations - Menaces

En raison des nombreux risques de confusion entre les deux sous-espèces, la répartition, l'état des populations et les menaces pesant sur le Plantain intermédiaire sont difficiles à évaluer.