Photo: F. ANDRIEU

Jacobaea erratica (Bertol.) Fourr., 1868

Séneçon à feuilles de barbarée

Famille des Asteraceae

Liste rouge	Arrêté ZH
NE	✓

Statut

Indigène

Protection

sans objet

Humidité édaphique

Période optimale d'observation

J F M A M **J** **J** A S O N D

Description

Plante vivace, à rameaux partant souvent de la base des tiges et insérés à 45-90°. Feuilles supérieures à segments écartés à angle droit, les radicales étalées, non dressées, lyrées, jamais réduites au lobe terminal. Rameaux florifères nombreux, étalés-divariqués, à fleurs jaunes tardives ; bractées involucrales internes majoritairement de 1,3 mm ou plus de large. Fruit : akènes de la périphérie glabres, ceux du centre finement pubescents.

Confusions possibles

Certains auteurs considèrent ce taxon comme une forme de *J. aquatica*, d'où les nombreuses confusions.

Caractères biologiques

Hémicryptophyte.

Caractères écologiques

Espèce hygrophile, eutrophile, des prairies de fauche inondables, roselières et friches hygrophiles.

Végétations concernées

Cette espèce est caractéristique des prairies mésotrophiles fauchées ou sous-pâturées sur sols inondables du *Bromion racemosi*.

Répartition géographique

Espèce médio-européenne. En France, cette espèce est répartie sur tout le territoire mais de manière très inégale. Assez largement distribuée en Bourgogne, dans le bassin de la Saône et en Aquitaine, elle devient plus rare en région méditerranéenne et très disséminée sur la façade nord-atlantique. Partout ailleurs, elle est absente ou disparue. Dans le bassin Seine-Normandie, cette espèce est présente ponctuellement dans le Calvados, dans l'Aisne et dans la Nièvre, de manière morcelée.

Espèce médio-européenne. En France, cette espèce est répartie sur tout le territoire mais de manière très inégale. Assez largement distribuée en Bourgogne, dans le bassin de la Saône et en Aquitaine, elle devient plus rare en région méditerranéenne et très disséminée sur la façade nord-atlantique. Partout ailleurs, elle est absente ou disparue. Dans le bassin Seine-Normandie, cette espèce est présente ponctuellement dans le Calvados, dans l'Aisne et dans la Nièvre, de manière morcelée.



Sociabilité - Etat des populations - Menaces

Le Séneçon à feuilles de barbarée semble en régression. Cependant, ce constat doit tenir compte de la difficulté d'identification de ce taxon, qui peut conduire à sous-estimer sa distribution.