

Serratula tinctoria subsp. tinctoria

Serratule des teinturiers

Famille des Asteraceae

Photo: S. FILOCHE

Liste rouge: NE

Arrêté ZH: ✓

Statut: Indigène

Protection: sans objet

Humidité édaphique

Période optimale d'observation: J F M A M J J A S O N D

Description

Plante vivace de 30-80 cm, à tige dressée ramifiée, sillonnée. Feuilles un peu rudes, alternes, très variables (ovales, elliptiques ou lancéolées), finement dentées en scie, mucronées, les basilaires et inférieures entières ou profondément divisées et pétiolées, celles des tiges sessiles et toutes profondément divisées en lobes étroits. Capitules nombreux, assez petits (5-8 mm de large), oblongs-cylindriques, groupés en corymbe à fleurs purpurines toutes en tube ; involucre rougeâtre à folioles extérieures ovales-lancéolées. Fruit : akène à aigrette roussâtre.

Confusions possibles

Taxon suffisamment caractéristique pour ne pas être confondu avec un autre, même à l'état végétatif. La taxon est très variable et présente de nombreux écotypes.

Caractères biologiques

Hémicryptophyte.

Caractères écologiques

Taxon héliophile ou de demi-ombre, mésotrophile à oligotrophile, acidiphile à basiphile, des sols argileux, limoneux ou tourbeux, humides à secs : prairies et ourlets hygrophiles sur sols oligotrophes à mésotrophes, pelouses marnicoles, boisements thermophiles ou acidiphiles.

Végétations concernées

Le taxon s'observe dans des végétations variées mais principalement dans les prairies et ourlets hygrophiles sur sols oligotrophes à mésotrophes des *Molinietalia caeruleae*, en particulier dans les moliniaies alcalines et prairies alluviales du *Molinion caeruleae*, mais aussi dans les pelouses marnicoles du *Mesobromion erecti*. Il s'observe également dans les ourlets acidiclines humides des *Melampyro pratensis - Holcetea mollis*. Il existe aussi des populations liées à des ourlets calcicoles secs de chênaies thermophiles du *Quercion pubescentis* ou à des forêts acidiphiles du *Quercion roboris*.

Répartition géographique

Taxon eurasiatique, réparti sur l'ensemble de la France, avec une très grande hétérogénéité. Sa présence est massive dans le bassin de la Loire (régions Centre et Pays-de-la-Loire essentiellement), dans l'ouest du Massif central, le Jura, les Alpes externes, les Pyrénées et la vallée de la Saône. Ailleurs, sa répartition reste très diffuse, sous forme de populations plus ou moins dispersées, avec de grandes lacunes. Dans le bassin Seine-Normandie, le taxon est surtout connu sur les marges du plateau de Brie, dans la vallée du Loing, le Gâtinais, le massif de Rambouillet, sur les buttes du Vexin, sur le plateau de Langre, et dans l'Orne. Sa présence est plus ponctuelle dans les Ardennes, en Normandie et en Picardie.



Sociabilité - Etat des populations - Menaces

La Serratule des teinturiers est présente dans des habitats en général en régression (prairies humides oligotrophiles, ourlets) sous l'effet de l'abandon des pratiques de gestion extensive (pacage, fauchage). La plante semble mieux se maintenir dans les layons, lisières et fossés situés en contexte forestier, en raison de la gestion régulière par fauchage dont font l'objet ces milieux.