Carex cuprina (Sandor ex Heuff.) Nendtv. ex A.

Laîche cuivrée

Famille des Cyperaceae

Photo: F. PERRIAT

Liste rouge: NE

Arrêté ZH: ✓

Statut: Indigène

Protection: sans objet

Humidité édaphique

Période optimale d'observation: J F M A **M** **J** J A S O N D

Description

Plante vivace cespiteuse. Feuilles à limbe de 3-7 (-9) mm de largeur. Hampe robuste (diamètre > 2 mm), à angles un peu ailés et scabres, à faces plus ou moins concaves. Inflorescence compacte de 2-10 cm, souvent ramifiée à sa base ; épis femelles à leur base ; 2 stigmates. Fruit : utricules de 4-5,5 mm, à nervation saillante sur les 2 faces à maturité, d'abord verdâtres puis brun clair et luisants, bec de 1,2-2 mm, échancré de façon symétrique ; cellules épidermiques de l'utricule allongées-oblongues, à parois fines.

Confusions possibles

Risque de confusion important avec *Carex vulpina* qui possède un bec plus profondément incisé sur la face extérieure que sur la face intérieure (bec également incisé sur les deux faces pour *C. cuprina*).

Caractères biologiques

Hémicryptophyte cespiteux.

Caractères écologiques

Espèce hygrocline, neutrocline : bords des eaux, prairies humides, mégaphorbiaies, fossés et friches humides, forêts alluviales.

Végétations concernées

Espèce présente dans des prairies inondables, engorgées ou non de la classe des *Agrostietea stoloniferae* : communautés pâturées, souvent piétinées, mésohygrophiles, neutroclines du *Mentho longifoliae - Juncion inflexi*, mais surtout au sein des communautés longuement inondables de l'*Oenanthion fistulosae* (association de l'*Oenantho fistulosae - Caricetum vulpinae*, dans les dépressions des prairies fauchées du lit majeur des grandes et des petites vallées, sur substrat argilo-siliceux).

Répartition géographique

Espèce subméditerranéenne-subatlantique. Assez fréquente dans toute la France, elle se raréfie aux étages supérieurs des montagnes. Au sein du bassin Seine-Normandie, elle est répartie sur l'ensemble du territoire et bien représentée dans les principales vallées. En Normandie, elle est localisée au sein des marais de la Dives et le long du littoral de la Manche et du Calvados.



Sociabilité - Etat des populations - Menaces

Malgré les menaces pesant sur les zones humides auxquelles la Laîche cuivrée est inféodée, ses populations semblent stables dans le bassin Seine-Normandie.