Carex acuta L., 1753

Laîche aiguë, Laîche grêle

Famille des Cyperaceae

Photo: S. FILOCHE

Liste rouge: NE

Arrêté ZH: ✓

Statut: Indigène

Protection: sans objet

Humidité édaphique

Période optimale d'observation: J F M A **M** **J** J A S O N D

Description

Plante vivace de 50-100 cm, verte, à souche rampante courtement stolonifère. Tige d'abord penchée au sommet, triquètre, scabre. Feuilles souvent plus courtes que la tige, larges de 3-5 mm scabres, à gaines non filamenteuses. 2-4 épis mâles et 3-5 femelles, tous allongés, cylindriques, brunâtres, peu écartés, souvent mâles au sommet, sessiles ou l'inférieur pédonculé. Bractées inférieures sans gaine, dépassant la tige ; écailles brunâtres, lancéolées. 2 stigmates. Fruit : utricule verdâtre, ovale ou elliptique (3 mm), plan-convexe, nervé, à bec court et entier, dépassant ou non l'écaille.

Confusions possibles

Risque de confusion important avec trois autres grands carex rencontrés dans des milieux semblables, les critères suivants pourront aider à faire la distinction à l'état stérile entre : *Carex acuta* : pousse généralement en nappe, gaines non carénées, ne devenant pas fibreuses réticulées, souche brun rouge foncé, feuilles vertes ou glauques, ligule obtuse, 2 stigmates ; *Carex elata* : pousse généralement en touffe, gaines carénées, devenant fibreuses réticulées ; *Carex acutiformis* : ligule aiguë, 3 stigmates ; *Carex riparia* : souche brun pâle, feuilles nettement glauques. D'autre part, on peut distinguer *Carex nigra* de *Carex acuta* en examinant les feuilles : celles-ci sont papilleuses à la face supérieure chez *Carex nigra* et à la face inférieure chez *Carex acuta*.

Caractères biologiques

Hélophyte ou hémicryptophyte.

Caractères écologiques

Espèce neutrocline, hygrophile, des marges vaseuses mésotrophes : bords des étangs, berges basses des cours d'eau, mares, magnocariçaies, mégaphorbiaies, prairies humides, forêts alluviales (lisières).

Végétations concernées

Espèce présente dans les cariçaies des bords d'étangs, lacs, rivières et marais sur sols riches en matière organique de l'alliance du *Caricion gracilis*, et plus précisément dans la communauté mésotrophique du *Caricetum gracilis*.

Répartition géographique

Espèce boréo-eurasiatique, circumboréale, assez commune dans toute la moitié nord du pays, notamment dans la vallée de la Loire. Elle se raréfie nettement vers le sud, jusqu'à disparaître en région méditerranéenne. *Carex acuta* est assez commune dans tout le bassin Seine-Normandie, mais inégalement répartie, principalement à la faveur des grands cours d'eau.



Sociabilité - Etat des populations - Menaces

Espèce assez commune, mais en régression du fait de la dégradation généralisée des milieux humides favorables, de l'eutrophisation, etc.