Photo: S. FILOCHE

Carex acutiformis Ehrh., 1789

Laîche des marais, Laîche aiguë

Famille des Cyperaceae

Liste rouge: NE

Arrêté ZH: ✓

Statut: Indigène

Protection: sans objet

Humidité édaphique

Période optimale d'observation: J F M A **M** **J** J A S O N D

Description

Plante vivace de 40-100 cm, glaucescente, à souche rampante stolonifère. Tige triquètre, à angles aigus et scabres. Feuilles larges de 4-8 mm scabres. Epis mâles 2-4, épais, cylindriques-elliptiques, brun foncé, à écailles inférieures obtuses ; les femelles 2-4, cylindriques, denses, dressés, écartés, les inférieurs pédoncules. Bractée inférieure sans gaine, égalant environ la tige ; écailles brunâtres, lancéolées-acuminées ; 3 stigmates. Fruit : utricules brun gris, glabres, dressés, ovoïdes-trigones comprimés (4 mm), nervés, à bec bidenté dépassant un peu l'écaille.

Confusions possibles

Risque de confusion important avec 2 autres grandes laîches (*C. riparia*, *C. acuta*), rencontrées dans des milieux semblables, les critères suivants pourront aider à faire la distinction à l'état stérile : *Carex acutiformis* : souche brun-rouge foncé, feuilles vertes ou glauques, ligule aiguë, 3 stigmates ; *Carex acuta* : ligule obtuse, 2 stigmates ; *Carex riparia* : souche brun pâle, feuilles nettement glauques, ligule obtuse.

Caractères biologiques

Hélophyte ou hémicryptophyte.

Caractères écologiques

Espèce héliophile ou hémisciaphile, hygrophile, des substrats mésotrophes minéraux à organiques : roselières, magnocariçaies en bordures d'étangs, mares, mégaphorbiaies, aulnaies-frênaies, sous-strate de peupleraies, prairies humides, fossés, etc.

Végétations concernées

Espèce présente dans les cariçaies des bords d'étangs, lacs, rivières et marais sur sols riches en matière organique de l'alliance du *Caricion gracilis*, et plus précisément dans l'association du *Caricetum acutiformis*.

Espèce présente dans les cariçaies des bords d'étangs, lacs, rivières et marais sur sols riches en matière organique de l'alliance du *Caricion gracilis*, et plus précisément dans l'association du *Caricetum acutiformis*.

Répartition géographique

Espèce eurasiatique. En France, la Laîche des marais est largement répartie dans le Nord, l'Est et centre du pays. Elle est nettement plus disséminée dans l'Ouest et le Sud-Ouest, se raréfie fortement en région méditerranéenne et devient absente des Pyrénées, des Alpes internes et de Corse. Elle est fréquente dans tout le bassin Seine-Normandie, bien que plus rare dans la Manche.



Sociabilité - Etat des populations - Menaces

Espèce sociale pouvant former des populations étendues, omniprésente dans les zones humides. Ses populations sont stables, non menacées à court ou moyen terme.