# Carex canescens L., 1753

Laîche courte, Laîche blanchâtre

Famille des Cyperaceae

Photo: F. PERRIAT

Liste rouge: NE

Arrêté ZH: ✓

Statut

Indigène

Protection

Centre-Val de Loire, Île-de-France, Picardie

Humidité édaphique

Période optimale d'observation

J F M A **M** **J** **J** A S O N D

## Description

Plante à souche fibreuse, gazonnante, formant des touffes denses, dépourvue de stolons. Tige triangulaire, grêle et dressée, de 10-60 cm de hauteur, scabre au sommet. Feuilles d'un vert glauque, large de 2-3 mm, un peu rudes dans le haut, égalant à peu près la tige ; ligule courte (2-3 mm), lancéolée-aiguë. Inflorescence lâche, formée de 4-7 épis ovoïdes plus ou moins espacés ; bractée inférieure très petite ou nulle. Epis courts, à fleurs un peu distiques, unisexuées, les fleurs mâles à la base, écaille des fleurs, membraneuse, blanchâtre, courte, avec une nette nervure verte ; 2 stigmates; Fruit : utricule (2-3 mm) ovoïde, vert-jaunâtre, finement nervé, à bec court et tronqué.

## Confusions possibles

Les confusions sont possibles avec la laîche étoilée (*Carex echinata) ou la laîche allongée (Carex elongata), à physionomie proche et vivant dans les mêmes biotopes, mais qui présentent des utricules plus longs, étalés à maturité, sans écailles blanchâtres.*

## Caractères biologiques

Hémicryptophyte cespiteux. Multiplication végétative par des bourgeons naissant sur la courte tige souterraine.

## Caractères écologiques

Espèce héliophile ou de demi-ombre, oligotrophile, acidiphile, des substrats hydromorphes, souvent tourbeux : aulnaies marécageuses à sphaignes, dépressions des prairies tourbeuses, fossés et toubières acides.

## Végétations concernées

Espèce présente essentiellement dans les bas-marais acides du *Caricion fuscae* mais également dans les forêts marécageuses sur tourbes des *Alnetea glutinosae*.

## Répartition géographique

Espèce subcosmopolite, rare ou très rare en général, qui possède une aire de répartition très morcelée en France. Elle est présente dans les principaux massifs montagneux et plus disséminée en plaine, dans le massif armoricain, la Picardie, la Normandie, l'Île-de-France, le Centre et le Poitou. Dans le bassin Seine-Normandie, la laîche courte est rare et répartie sous forme de noyaux de populations dans le massif de Rambouillet (Yvelines), la forêt domaniale de Roumare (Seine-Maritime), le Laonnois et la Thiérache (Aisne), le pays de Bray (Seine-Maritime et Oise), la forêt d'Andaines (Orne), la lande de Lessay (Manche), le Morvan (Bourgogne) et la Meuse.




## Sociabilité - Etat des populations - Menaces

*Carex curta* forme des gazons parfois denses mais souvent peu étendus. Cette espèce est toujours rare (y compris en montagne), même si elle arrive à se maintenir dans un certain nombre de stations de plaine. Comme pour toutes les plantes des tourbières, ce sont essentiellement les menaces qui pèsent sur ses milieux de prédilection qui entraînent sa régression : drainage, pollution des eaux, rudéralisation, plantation de peupliers ou de résineux, ouverture de carrières, régression du pâturage bovin, retournements de prairies, etc.