Photo: F. PERRIAT

Carex bohemica Schreb., 1772

Laîche de Bohème, Laîche souchet

Famille des Cyperaceae

Liste rouge	Arrêté ZH
NE	✓

Statut

Indigène

Protection

Centre-Val de Loire

Humidité édaphique

Période optimale d'observation

J F M A M J **J** **A** **S** O N D

Description

Plante annuelle ou bisannuelle, cespiteuse. Tige trigone, lisse, de 20-60 cm de hauteur. Feuilles vert clair, planes, molles, larges de 2 à 3 mm, allongées et aiguës. Inflorescence verdâtre, en tête compacte d'environ 2 cm de diamètre, dépassée de 2-5 bractées foliacées inégales, allongées, pouvant atteindre 15 cm. Epis nombreux, courts, sessiles, ovoïdes-lancéolés, mâles à la base et femelles au sommet ; écailles étroites, plus courtes que l'utricule, terminées en arête, celles des fleurs femelles blanchâtres ; fleurs femelles à 2 stigmates. Fruit : utricules vert pâle ou vert jaunâtre, mesurant 8-10 mm, brièvement pédicellés, se terminant en un long bec bifide et denticulé.

Confusions possibles

C'est une espèce qui présente une allure très caractéristique et qui ne peut être confondue, à première vue, qu'avec un *Cyperus*.

Caractères biologiques

Hélo-thérophyte ou hélo-hémicryptophyte.

Caractères écologiques

Espèce héliophile, hygrophile, des substrats oligotrophes à mésotrophes : berges exondées vaseuses des étangs et des marais temporairement asséchés.

Végétations concernées

Espèce présente dans les groupements pionniers et thermophiles de l'*Elatino triandrae - Eleocharition ovatae*, se développant tardivement sur substrats exondés.

Répartition géographique

Espèce eurosibérienne, présente, mais de façon assez sporadique, dans une grande partie de l'Europe

centrale et orientale, rare et erratique en Europe atlantique. En France, elle a été signalée dans un grand quart nord-est, en Alsace, Lorraine, Franche-Comté et Bourgogne, jusque dans le Dauphiné. Vers l'ouest, elle ne dépasse pas les environs de Paris, la Sologne et la Brenne. A l'échelle du bassin Seine-Normandie, elle est très rare et ne subsiste que dans quelques stations isolées : Hurepoix (Yvelines), Puisaye (Loiret et Yonne), Champagne humide (Aube), montagne de Reims et Tardenois (Marne).



Sociabilité - Etat des populations - Menaces

C'est une plante à éclipse qui possède une capacité de dormance très élevée et peut réapparaître, lorsque les conditions de milieux sont favorables. Elle ne forme que rarement des populations importantes. Elle est en régression sur l'ensemble du Bassin parisien, où elle n'a pas été revue depuis longtemps. Elle est surtout menacée par les changements de mode de gestion des niveaux d'eau des étangs et par l'intensification des pratiques (eutrophisation des milieux, mise en assec des étangs de moins en moins régulière ou, au contraire, abandon des pratiques et absence d'entretien).