Photo: F. PERRIAT

Carex appropinquata Schumach., 1801

Laîche paradoxale

Famille des Cyperaceae

Liste rouge	Arrêté ZH
NE	✓

Statut

Indigène

Protection

Champagne-Ardenne

Humidité édaphique

Période optimale d'observation

J F M A **M** **J** J A S O N D

Description

Plante vivace de 40-80 cm de hauteur, cespiteuse, formant des touradons. Tiges dressées, grêles, scabres uniquement dans leur partie supérieure, triangulaires, à 3 faces convexes. Feuilles rudes sur les bords, de 1,5-3 mm de largeur, allongées et aiguës ; gaine foliaire des feuilles inférieures réduite à des fibres formant une masse noirâtre. Inflorescence en panicule étroite de 3-10 cm de longueur, lâche dans sa partie inférieure ; bractée inférieure ovale-étroite, prolongée en une pointe. Fruit : utricules brun terne, fortement nervés sur les deux faces, à bec court, celui-ci étant denticulé sur les bords dans sa partie supérieure ; écailles femelles à marge hyaline très étroite ou nulle.

Confusions possibles

Le risque de confusion est possible avec la laîche paniculée (*Carex paniculata*) mais la Laîche paradoxale s'en distingue par sa taille plus petite, ses feuilles plus étroites et généralement plus courtes que les tiges.

Caractères biologiques

Hémicryptophyte cespiteux.

Caractères écologiques

Espèce héliophile des substrats tourbeux et mésotrophes, généralement alcalins : bord d'étangs, marais, tourbières et prairies tourbeuses.

Végétations concernées

Espèce présente essentiellement dans les végétations denses de grands *Carex* des *Magnocaricetalia elatae* (notamment dans le *Magnocaricion elatae*).

Répartition géographique

La laîche paradoxale est présente dans le nord et le centre de l'Europe. En France, elle est globalement rare, disséminée dans le Nord, l'Est, le Centre, une partie de l'est du massif-Central. Elle est absente dans l'Ouest, où elle semble avoir disparu en Bretagne et en Normandie, dans le Sud-Ouest, ainsi que dans la région méditerranéenne. Dans le bassin Seine-Normandie, les stations sont très ponctuelles et localisées principalement en Champagne crayeuse (Aube et Marne), dans le pays d'Othe (Aube et Yonne), dans le Laonnois et plus particulièrement dans les marais alcalins de la Souche (Aisne), dans la Brie champenoise. Elle est très rare à exceptionnelle ailleurs : Champagne humide, Morvan, Essonne, Eure-et-Loir, Oise, Aisne (Tardenois), etc.



Sociabilité - Etat des populations - Menaces

La laîche paradoxale est une espèce cespiteuse formant des touffes assez importantes. Les populations sont cependant rarement très étendues. Elle est en forte régression, menacée par l'ensemble des dégradations touchant les zones tourbeuses (fermeture, drainage des marais alcalins, eutrophisation, pompages, abandon du pâturage, populiculture...).