Liste rouge: NE

Arrêté ZH: ✓

Statut: Indigène

Protection: sans objet

Humidité édaphique

Période optimale d'observation: J F M A M **J** **J** **A** **S** O N D

Calystegia sepium (L.) R.Br., 1810

Liseron des haies

Famille des Convolvulaceae

Photo: S. FILOCHE

Description

Plante vivace de 1-5 m, verte et glabre, à souche très longue. Tiges fortement volubiles-grimpantes, anguleuses. Feuilles grandes, sagittées ou hastées, aiguës, longuement pétiolées, à oreillettes tronquées, entières ou sinuées-lobées. Fleurs blanches, très rarement rosées, très grandes (4-6 cm), solitaires sur des pédoncules axillaires plus courts ou plus longs que la feuille ; 2 bractées foliacées, ovales-lancéolées, en coeur à la base, recouvrant le calice ; celui-ci glabre, à lobes ovales-lancéolés ; corolle glabre ; capsule subglobuleuse, glabre.

Confusions possibles

Cette espèce ressemble très fortement au liseron des champs (*Convolvulus arvensis*), qui se distingue par son calice nu sans bractées recouvrantes (alors que *Calystegia sepium* possède un calice recouvert par des bractées foliacées).

Caractères biologiques

Hémicryptophyte à stolons.

Caractères écologiques

Plante hygrocline, ubiquiste, des substrats enrichis en nutriments : haies, fruticées hygrophiles, lisières humides, aulnaies, roselières, mégaphorbiaies, friches vivaces eutrophiles, cultures irriguées, etc.

Végétations concernées

Le liseron des haies est une espèce caractéristique des mégaphorbiaies eutrophiles, dans les communautés riveraines et alluviales, dans la partie moyenne et supérieure des cours d'eau et des bordures de lacs, au sein de l'ordre des *Convolvuletalia sepium*. On le trouve également parmi les fruticées des vallées des rivières à eau courante et des plans d'eau stagnante, mésophiles à mésohygrophiles, dans la sous alliance du *Salici cinereae - Viburnenion opuli*. *Calystegia sepium* est également présente dans les gazons en bordure de plan d'eau et de cours d'eau, soumis à des

variations de niveau, de l'ordre des *Chenopodietalia rubri*, ainsi que dans les ourlets nitrophiles forestiers, sur sols généralement bien alimentés en eau, de l'ordre des *Galio aparines - Alliarietalia petiolatae*.

Répartition géographique

Espèce paléotempérée, le liseron des haies est commun sur tout le territoire français jusqu'à l'étage montagnard, y compris dans tout le bassin Seine-Normandie.



Sociabilité - Etat des populations - Menaces

Calystegia sepium est commune en France et n'est pas menacée à court ou moyen terme.