

Carex demissa Vahl ex Hartm., 1808

Laïche déprimée, Laïche vert jaunâtre

Famille des Cyperaceae

Photo: Y. FERREZ

Liste rouge

NE

Arrêté ZH



Statut

Indigène

Protection

sans objet

Humidité édaphique



Période optimale
d'observation

J F M A M J J A S O N D

Description

Plante vivace de 20-70 cm. Feuilles larges de 2-4,5 mm, les inférieures et moyennes à ligule longue au plus de 5 mm. Inflorescence à épis en majorité unisexués, l'épi mâle étant solitaire dans le haut, les épis femelles disposés dans le bas ; épi mâle supérieur à 1 cm, courtement pédonculé (pédoncule généralement inférieur à 1 cm) et épis femelles de 5,5-8 mm de diamètre, dressés, cylindriques à ovoïdes ou subglobuleux, à fleurs nombreuses, l'inférieur souvent placé au milieu de la hampe ; écailles femelles obtuses à aiguës mais non mucronées, à marge hyaline étroite. Fruit : utricules glabres, de 2-4 mm, serrés, imbriqués, peu réfléchis, à bec plutôt droit de 0,7-1,7 mm, bidenté (dents de 0,1-0,3 mm).

Confusions possibles

Risque de confusion entre les sous-espèces de *Carex viridula* et *Carex flava*. *C. viridula* est pourvu d'épis femelles moins larges (moins de 8 mm de diamètre) et d'utricules plus courts (moins de 4 mm) ; subsp. *brachyrrhyncha* : utricules à bec nettement courbé ou oblique et dont le corps est rétrorse sur plus de la moitié de l'épi, l'épi mâle étant sessile ou à pédoncule de 20 mm ou plus ; subsp. *viridula* : utricules tous à bec sensiblement droit, la majorité des épis femelle étant rapprochés et groupés à l'apex de la tige (ou seul l'inférieur étant distant).

Caractères biologiques

Hémicryptophyte cespiteux.

Caractères écologiques

Taxon neutro-acidiphile, des sols frais et plus ou moins tourbeux : layons et coupes forestières, moliniaies, landes mésophiles, tourbières basses, landes humides.


Végétations concernées

Taxon présent dans les végétations de l'alliance du *Caricion fuscae*, communautés de bas-marais acidoclines à acidiphiles, sur sols tourbeux à paratourbeux, oligotrophes et peu oxygénés, mais aussi

dans les formations alcalines de l'*Hydrocotylo vulgaris* - *Schoenion nigricantis*. Le taxon est également rencontré au sein des jonchaies oligotrophiles à mésotrophiles du *Juncion acutiflori*.

Répartition géographique

Taxon boréo-subatlantique, dispersé en France siliceuse, absent de la plaine méditerranéenne. La laïche déprimée est dispersée dans le territoire du bassin Seine-Normandie, avec localement des populations plus denses dans les marais du Cotentin (Manche) et le Bessin (Calvados). Il est plus rare en Champagne-Ardenne, Picardie et Haute-Normandie.



Sociabilité - Etat des populations - Menaces

La Laïche déprimée, assez rare et localisée, semble en régression, menacée par l'eutrophisation et la dégradation des habitats tourbeux.