Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre, 1800

Renouée à feuilles de patience

Famille des Polygonaceae

Photo: F. PERRIAT

Liste rouge: NE

Arrêté ZH: ✓

Statut

Indigène

Protection

sans objet

Humidité édaphique

Période optimale d'observation

J F M A M J J A S O N D

Description

Plante annuelle de 20-80 cm, glabre ou pubescente. Tige dressée ou couchée, rameuse. Feuilles en général aussi longues ou dépassant la longueur de 2 entre-noeuds, ovales-lancéolées ou lancéolées, atténuées en pétiole, ponctuées-glanduleuses, vertes ou blanchâtres-tomenteuses en dessous ; gaines (ochréas) tronquées, non ou courtement ciliées, presque glabres. Inflorescence en épis oblongs-cylindriques, compacts, dressés ou penchés à maturité, à fleurs blanc-verdâtres ou roses ; pédoncules, pédicelles et périanthes glanduleux-rudes. Fruit : akène de 2-3 mm, tous lenticulaires à faces concaves, lisses et luisants.

Confusions possibles

Espèce proche de la Renouée persicaire (*Persicaria maculosa*), qui possède notamment des ochréas longuement ciliés, munis de poils plus ou moins denses, et des tépales dépourvus de glandes. Ces deux espèces croissent assez souvent en mélange.

Caractères biologiques

Thérophyte.

Caractères écologiques

Plante hygrocline, des substrats limoneux ou argilo-limoneux, relativement riches en éléments nutritifs et plutôt compacts : champs cultivés, jachères, jardins, friches (décombres), villages et bords des eaux (rivières, mares et étangs).

Végétations concernées

L'espèce se rencontre dans les végétations à annuelles des vases exondées des *Bidentetalia tripartitae*, ainsi que dans les communautés des cultures sarclées, sur sols eutrophes des *Chenopodietalia albi*.

Répartition géographique

Espèce eurasiatique, circumboréale, disséminée dans toute la France, avec une fréquence particulièrement élevée dans le Massif central. La plante semble plus rare dans la moitié sud du pays et très rare en Corse. Dans le bassin Seine-Normandie, elle est largement présente en Île-de-France, dans le Calvados, et du Perche au Morvan. Elle est en revanche plus rare dans le nord et l'est du territoire, sauf le long de l'arc humide de Champagne. Elle est probablement largement sous-inventoriée en Normandie (Calvados excepté).



Sociabilité - Etat des populations - Menaces

En raison de son caractère nitrocline et de son adaptabilité aux sols dégradés, la Renouée à feuilles de patience colonise une large gamme de milieux, ce qui la met à l'abri de toute régression.